


Dieser Fütterungsplan ist ein Hilfsmittel bei Problemen mit der Fütterung Ihrer Sauen. Er ist vor allem für die Ferkelerzeuger mit der Youna-Sau gedacht, kann aber auch auf andere Gene+ Genetik übertragen werden. Diese Empfehlungen gelten in den meisten landwirtschaftlichen Betrieben, aber in einigen Fällen sind sicher Anpassungen notwendig.



Die Beherrschung des körperlichen Zustandes Ihrer Sauen ist der Schlüssel zu hoher Futteraufnahme in der Säugephase und damit einer hohen Milchproduktion. Zu fette Sauen bei Beginn der Trächtigkeit (über 21mm Sepeckdicke) brauchen während der Trächtigkeit weniger Futter.

Nach dem Absetzen müssen Sie Ihre Sauen in einer Weise füttern, daß Sie einheitliche Gruppe für die Ultraschalldiagnostik erhalten.

Nach der Ultraschalldiagnostik sollen die Sauen ein höheres Körpergewicht und eine Speckdicke zwischen 19 und 21 mm bis zum Abferkeln halten.

Zögern Sie während dieser Periode nicht, den täglichen Futtermittelverbrauch zu reduzieren, wenn ein zu hoher Verzehr zu einem zu hohen Körpergewicht Ihrer Herde führt (besonders in sommerlicher Periode).

Die Erhöhung der Futtergaben 3 Wochen vor dem Abferkeln bringt der Sau mehr Kraft und mehr Gewicht für die Ferkeln bei der Geburt.

Unmittelbar nach dem Abferkeln die Ration erhöhen, soviel die Sau aufnimmt.

.... Und ein neuer Zyklus startet